



Vildttiltag

V/ Hanne Juncher Fris

Indflyvning...



Ny forskning viser, at insekter er gået tilbage med 75%




Bestøverne er vigtige for os – og for naturen



Bidraget til en levende natur
Er med til at
Forbedrer u
og frugtavl
Vilde bier er
honningbier

SEGES

Foto: Michael Strarup Nielsen



Etablering og pasning af insektvolde

Etablering og pasning af insektvolde

Korrekt valg af frø- og arter til insektvolden

Hvor- og hvordan etableres og anvendes insektvolde typisk?

Tilskudsmuligheder til insektvolde ift. grundbetaling.

Vigtigt element

- Levested og overvintringssted for insekter
- Fødekammer for jordrugende fugle og dermed større dyr
- Skjul
- Jordrugende fugle kan etablere rede på og omkring volden



Fote: DJ

Etablering og pasning af insektvolde

- Etableres ved at pløje sammen fra begge sider, udjævn evt. dyb plovfure efterfølgende
- Øst-vest
- 40-50 cm høj
- Bredde ca. 2m.
- September / sædskifte
- Tilpas markdriften

<https://youtu.be/AuHTsWHUCOY>

Etablering og pasning

- Slåning
- Kun pletvis sprøjte – tag det i opløbet!

The background of the slide is a photograph of a rural landscape. In the foreground, there is a field of yellow wildflowers. In the middle ground, there are rolling green hills. In the background, a line of trees with autumn-colored foliage is visible under a clear sky.

Sprøjtepraksis

Brug afdriftsreducerende teknik
Benyt altid 90 procent afdriftsreducerende sprøjteknik
Sænk bommen til maksimalt 50 centimeter
Kør langsomt og helst i medvind
Samme sprøjteknik bruge langs vandløb, søer og §-3 natur, når du vil nedsætte sprøjteafstanden ved udbringning af midler med afstandskrav

Luk de yderste dyser
Undgå sprøjtning af vej- og markkanter. Ved at passe på markkanternes vilde planter giver du bedre betingelser for de vilde insekter, samtidig med at pladsen tages fra de uønskede ukrudtsarter.
Luk de yderste dyser, når du bruger skadedyrsmidler


Kend bekæmpelsestærsklerne
Bekæmp kun skadedyr, når bekæmpelsestærsklerne er overskredet.
Brug så vidt muligt specifikke skadedyrsmidler som Pirimor eller evt. Mavrik Vita mod bladlus

SEGES

A circular logo with a green border. Inside the circle, the words 'BRUG' and 'FOR' are visible, along with some other text that is partially obscured.

INGEN afdrift fra sprøjten!!

- Beskyt insektvolden med andre marktiltag



Kilde: gwtc.org.uk

Korrekt valg af frø- og arter til insektvolden

- Tuegræsser
 - Giver insekter gode overvintringsmuligheder
- Hundegræs, fløjlsgræs og timothé
 - Tuegræsser vil som udgangspunkt presse ukrudtsarter væk



Foto: Southwoodsforestgardens.blogspot.com

Hundegræs



- Hundegræs, billede 1 + 3: biopix.dk
- Billede 2: vildtremisen

Fløjlsgræs



- Billede 1: Wikiwand, billede 2: Fugleognatur, billede 3: naturporten

Timothé



- Billede 1: Dreamstime.com, billede 2: alamy.com, billede 3: feedipedia.com

Andre velegnede frø til insektvolde og arealet omkring

Merian

Gul Snerre

Alm. Røllike

Alm. Gyldenris

Alm. kællingetand

Musevikke

Håret høgeurt

Vellugtende gulaks

Blåhat

Alm. syre

Vild gulerod

Rundbælg

Lancet-vejbred

Engsvingel

Kommen

Slangehoved

Stor knopurt

Kamgræs

Hvid okseøje

Alm. knopurt

Kløver

Etablering af plantedække

- Håndsåning, mest variation og mindst skade på insektvolden
- Frø blandes med sand
- Etableringstidspunkt
- Slå striben hyppigt i første vækstsæson



Foto: Jørn Pagh Bertelsen

Hvor anvendes insektvolde typisk

- Hvor der har været gamle skel
- Korridorer og ledelinjer
- Biotopplaner
- Naturplaner
- Booste insektlivet på gamle ejendomme
- I tilknytning til eksisterende natur

Kile, jagt, arrondering




Synergi for driften i marken



Korridor og ledelinje



Ledelinje, booste insektlivet og naturplan



Biotopplan











I tilknytning til eksisterende natur



§ 3-Natur 4+
GeoInfo
★★★★★ 4.6, 8 vurderinger
Gratis



Brug dit udbyttekort som guideline



Tilskudsmuligheder til insektvolde ift. grundbetaling

Vejledning om grundbetaling 2020

3.10.4 Insektvolde


En insektvold er en lille jordvold, som fx er skabt ved at pløje to furer sammen. Der er ikke noget krav til plantedække på en insektvold, så længe det holdes fri for tilgroning af vedplanter.

Du kan placere insektvolden, hvor det kan passe ind i markdriften. Insektvolden må ikke være bredere eller højere end, at man kan fjerne den ved almindelig pløjning. Vi anbefaler derfor, at den maksimale højde på insektvolden er ca. 0,5 meter.

- Ikke omfattet af et aktivitetskrav, altså landbrugsaktivitet.
- Ingen N-norm
- Nej på permanent græs

Tilskudsmuligheder til insektvolde ift. grundbetaling

- 10x10x10 reglen



- Permanent genopdyrkningsret

Tilskudsmuligheder til insektvolde ift. grundbetaling

Insektvold på braklagt areal

3.10.5 Vildt- og bivenlige tiltag på braklagte arealer

Du må gerne etablere vildt- og bivenlige tiltag på dine braklagte arealer, så længe du ikke etablerer dem med majs eller korn i renbestand eller en blanding af disse¹¹³.


Vildt- og bivenlige tiltag på brakarealer er ikke omfattet af aktivitetskravet. Når de etableres på braklagte arealer, er de heller ikke omfattet af forbudsperioden mod slåning, se afsnit 3.4.2¹¹⁴. Det betyder, at du gerne må slå vildtstriber på et brakareal i forbudsperioden uanset, om du anvender arealet til slåningsbrak, bestøverbrak eller blomsterbrak.

Insektvold på areal med miljøtilsagn

3.10.6 Vildt- og bivenlige tiltag på arealer med miljøtilsagn

Du må som udgangspunkt ikke etablere vildt- og bivenlige tiltag på arealer med miljøtilsagn. For enkelte af de ældre 20-årige miljøtilsagn kan det være tilladt at etablere vildtstriber og insektvolde. Se i dit tilsagn, hvad der er muligt på dit areal for det pågældende miljøtilsagn, eller tag kontakt til os og forhør dig om muligheden. Vi kan ikke give dispensation til barjordsstriber.

Opsummering




Husk også...

The wader numbers at Langholm have been monitored since 1992 along a series of transects. Analysis of these wader counts shows that their numbers collapsed when the predator control finished in 1999²¹. Figure 11 shows that this amounts to about a 75% reduction in nine years. By 2008 there was no evidence that the decline had stopped.

Figure 11
Changes in numbers of breeding waders on Langholm moor since 1992. Gamekeepers were employed to control predators until 1999.

Golden plover
Lapwing
Curlew



Det må godt rode



Rod er hipster!



Nyt på vej?

- ECO schemes
- Conservation Headlands i England






Hvis I vil vide mere

- **velas** Erfa grupper indenfor jagt- og vildtpleje

Hanne Juncher Fris
Jagt- og Naturplejekonsulent
M: 3036 4741
hjk@velas.dk





Tak for ordet!



★velas